

Teeltbeschrijving Fuchsia

Grond

Gebruik een luchtige kwalitatief goede oppotgrond. Meestal wordt uitgegaan van een verhouding 50 % tuinturf en 50 % veenmosveen. 10% perlite kan worden toegevoegd bij een eb en vloedmengsel. Als bemesting 1-1,5 kg P.G. mix toevoegen.

Temperatuur

Starttemperatuur ± 17 °C. Na het toppen kan men een negatieve D.I.F. toepassen, d.w.z. een hoge nachttemperatuur van ± 17 °C en een lage dagtemperatuur van ± 13 °C. Deze temperatuurinstelling zorgt voor minder celstrekking, dus een compactere groei. De gemiddelde etmaaltemperatuur moet wel ± 15 °C zijn, een lagere gemiddelde temperatuur geeft een latere bloei.

Toppen

Op 3-5 bladparen al naar gelang het aantal planten per m² en de potmaat.

Belichten

Vanaf week 1 kan belicht worden. De dag verlengen tot 16 uur, met tenminste 15 watt per m². Ook kan cyclisch belicht worden (6 min. per half uur). Bloei kan verwacht worden 8-10 weken na aanvang belichting. Men kan beginnen met belichten direct na het oppotten.

Bemesting

Als de planten doorgeworteld zijn tijdens elke gietbeurt, 2 tot 2,5 EC bijmesten met een mengsel van 75% kalisalpeter en 25% bitterzout. Tijdens de teelt een paar keer afwisselen met een mengmest, b.v. 20-20- 20.

Groeibeheersing

Door het toepassen van D.I.F. en door zo droog mogelijk te kweken, is de groei al redelijk te beheersen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de volgende groeiregulatoren.

- Cycocel(750 gr/lt):60-100 cc per 100 liter water
- Alar 85: 200-400 gram per 100 liter water
- Bonzi: 25-50 cc per 100 liter water

Bonzi niet meer gebruiken als de knop goed zichtbaar is! Remmen als de potkluit vochtig is, 's morgens direct na zonsopgang of 's avonds, dit om bladverbranding te voorkomen.

Belangrijke tip

Remmen na een watergift, maar ga geen water geven om te kunnen remmen, probeer het water geven zo lang mogelijk uit te stellen, hierdoor kunt U de groei ook zeer goed beheersen!!!

Gewasbescherming

Botrytis is de voornaamste ziekte bij Fuchsia's die veel uitval kan veroorzaken. Dit is te voorkomen door tijdig luchten en de R.V. niet boven de 80 % te laten komen. Chemisch bestrijden met Rovral, Teldor en Thiram. Witte vlieg kan bestreden worden met Admire, Admiral, Teppeki, Aseptacarex, Decis en Applaud. Luis met Admire of Plenum. Thrips met Vertimec of Mesurol.

Controleer zelf of de middelen die u gebruikt zijn toegelaten in het land van opkweek. Hendriks Young Plants is hier niet verantwoordelijk voor.

Indien u meer informatie wenst, kunt u altijd contact met ons opnemen.